

INFORMATIONS SUR LA BERCE DU CAUCASE

DESCRIPTION

La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et toxique. Elle présente un risque pour la santé et pour l'environnement.

Chez l'humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase, combiné avec l'exposition à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels), cause des lésions à la peau. Ces lésions sont semblables à des brûlures. Par ailleurs, quand cette plante croît dans un milieu, elle s'étend rapidement et nuit à la croissance des autres plantes qui y poussent déjà.

La berce du Caucase pousse dans les milieux frais et humides, comme :

- Le long des berges des cours d'eau;
- Le long des fossés;
- Le long des chemins de fer;
- Le long des routes;
- Dans les prés;
- Dans les terrains vagues.



DISTINGUER LA BERCE DU CAUCASE ET LA BERCE LAINEUSE/GRANDE BERCE

La berce laineuse, aussi appelée grande berce, ressemble beaucoup à la berce du Caucase. Cependant, la berce laineuse n'est pas envahissante. Elle ne pose pas de risque pour l'environnement.

Descriptions	Berce du Caucase (Envahissante)	Berce laineuse/Grande berce (indigène du Québec)
Hauteur	La plante peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur.	La berce laineuse ne dépasse pas 3 mètres de hauteur.
Couleur de fleur	Blanc	Blanc
Tiges	<ul style="list-style-type: none"> • Très robuste et creuse; • Mesure de 4 à 10 cm de diamètre; • Recouverte de poils blancs rudes, éparpillés sur toute la tige mais surtout présents à la base de la tige des feuilles; • Elle présente de nombreuses taches de couleur rouge framboise à violet, étendues et bien définies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sa tige est entièrement recouverte de poils blancs, souples et d'aspect feutré. • Certaines parties de la tige peuvent avoir une nuance de rouge. Les taches ne sont pas aussi colorées que pour la berce du Caucase.
Feuilles	<ul style="list-style-type: none"> • Elles se divisent en 1 à 3 feuilles plus petites, profondément découpées et pointues qui peuvent atteindre 1,5 mètre de largeur et 3 mètres de longueur. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'envers des feuilles a une texture feutrée, abondamment recouverte de poils blancs, souples et laineux.

Berce du Caucase



Berce laineuse/Grande berce



ÉLIMINER LA BERCE DU CAUCASE

Étant donné les effets nuisibles de la berce du Caucase sur l'environnement et la santé, il est très important d'empêcher cette plante de s'étendre.

Évitez donc de la semer, de la planter, de la multiplier ou de la transporter.

Avant de prendre des mesures de lutte contre la berce du Caucase, vous devez toutefois prendre soin :

- De bien identifier la plante, afin de ne pas la confondre avec la berce laineuse;
- De trouver les colonies (ensemble des plantes), idéalement au début du printemps;
- De vous protéger pour éviter les brûlures causées par les contacts avec la sève de la plante.

Si vous devez manipuler la berce du Caucase, protégez-vous adéquatement :

- Couvrez toutes les parties de votre corps avec des vêtements non-absorbants (matériaux synthétiques et imperméables). Ex : pantalon, chandail à manches longues, gants en caoutchouc recouvrant le poignet et l'avant-bras;
- Portez une attention particulière aux extrémités de vos vêtements : protégez bien vos poignets, vos chevilles et votre cou;
- Protégez-vous les yeux et le visage avec une visière.

EMPÊCHER LA BERCE DU CAUCASE DE POUSSER

Plantes poussant de façon isolée ou recouvrant une petite surface de terrain

- Vous pouvez couper la racine des jeunes plantes avec une pelle ronde bien affûtée. Commencez dès le début du printemps et répétez l'action toutes les 2 semaines, afin d'épuiser les plantes;
- Répétez les coupes chaque année, pendant plusieurs années, afin d'éliminer totalement les plantes;
- Utilisez un appareil qui tourne et qui mélange la terre, comme un rotoculteur, pour éliminer les petits plants en forte densité;
- Vous pouvez recouvrir le secteur avec une toile géotextile après avoir éliminé les plantes lorsque la colonie n'est pas trop importante et que le terrain ne présente pas trop de contraintes, afin de limiter les repousses.

Plantes adultes ou recouvrant de grandes surfaces de terrain

- Faites une coupe à environ 15 cm du sol;
- Répétez au moins de 2 à 3 fois au cours du printemps;
- Coupez la racine à une profondeur d'environ 20 cm sous la surface du sol. Utilisez une pelle ronde bien affûtée;
- Travaillez le sol, par exemple en le labourant à une profondeur d'environ 24 cm. Cela limitera la repousse des plantes;
- Faites sécher les plants coupés;
- Si les plantes portent des graines, évitez de les disperser;
- Détruisez les ombelles en les plaçant dans des sacs en plastique robustes et parfaitement fermés. Laissez les sacs au soleil pendant au moins une semaine;
- Ne compostez aucune partie de la plante;
- Pour éviter que la berce du Caucase envahisse de nouveau votre terrain, vous pouvez planter de nouvelles plantes dans le secteur traité. Choisissez de préférence des plantes originaires de votre région qui poussent rapidement. Informez-vous auprès de votre centre jardin local.



APRÈS LA MANUPLICATION

- Enlevez vos vêtements et retirez vos gants en les retournant à l'envers;
- Évitez que les vêtements que vous avez porté pendant la manipulation touchent d'autres objets ou vêtements, pour ne pas les contaminer avec la sève;
- Lavez vos vêtements à la machine avant de les porter à nouveau;
- Lavez à l'eau et au savon les outils qui sont venus en contact avec la sève de la plante, comme le sécateur et la débroussailleuse;
- Lavez-vous les mains et le visage avec de l'eau et du savon.

RÉACTIONS ALLERGIQUES CAUSÉES PAR LA BERCE DU CAUCASE

Description

La berce du Caucase est une plante exotique toxique. La sève de la berce du Caucase contient des toxines qui sont activées par la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels). Le contact avec la sève de cette plante, combiné avec l'exposition à la lumière, cause de la douleur et des lésions à la peau semblables à des brûlures.

Symptômes

Des lésions douloureuses, parfois graves, peuvent apparaître jusqu'à 48 heures après le contact de la peau avec la sève de la berce du Caucase. Les lésions sont caractérisées par :

- Une rougeur et une enflure de la peau;
- Des cloques et des ampoules;
- Des brûlures superficielles ou plus graves (1^{er} ou 2^e degré).

Appelez Info-Santé 811 pour plus d'information sur les mesures à prendre en cas de contact avec la sève de l'herbe à la puce.

ATTENTION – DEMANDE DE PERMIS REQUIS DE LA MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS POUR TOUS TRAVAUX DANS LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE

Du fait, la berce du Caucase peut se situer à proximité des milieux riverains. Si tel est le cas, un permis de la Municipalité devra être délivré pour effectuer tout travail dans la bande de protection.

Pour qu'un permis soit délivré, vous devrez fournir :

- Le formulaire de demande de permis, dûment rempli et signé, que vous trouverez sous le lien suivant : https://www.morinheights.com/IMG/pdf/16-travaux_en_milieu_riverain_quai.pdf
- Un plan de re-végétalisation de la bande riveraine (aucun paillis, gravier, rocaille, machinerie, tonte et autre matière ou ouvrage limitant la pousse des végétaux n'est autorisée dans la rive).
- Explications sur comment vous allez supprimer la berce du Caucase (les travaux doivent être faits manuellement ou avec des outils manuels seulement quand on est dans la bande de protection riveraine).

Il est très important qu'aucun autre travail ne soit effectué avant l'émission du permis.

Source 1 : <https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-eliminer-la-berce-du-caucase>

Source 2 : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/brulures-causees-par-la-berce-du-caucase#c2574>